



Observation
Sur les effets consécutifs du Virus
Vénérien.

Au Commencement du mois de juin 1781 M. De *** Officier au Régiment de ... en jouant avec M. M. ses camarades fut fortement piqué aux testicules. Il y sentit une douleur assez vive, qui ne l'empêcha cependant pas de se rendre à pied à son logement qui étoit éloigné du lieu où il fut blessé. Son repos en fut trouble pendant la nuit; il me fut appelé le lendemain matin. Je trouvai un peu de gonflement au testicule du côté droit, et une légère rougeur au scrotum, sans contusion apparente. Je lui proposai de le saigner; mais son extrême répugnance pour cette opération l'empêcha d'y consentir. Il se soumit avec la plus grande exactitude à tous les autres moyens antiphlogistiques. Je le mis au bouillon pour toute nourriture; Je lui fis donner des lavemens émolliens. J'appliquai des cataplasmes avec la pulpe des plantes émollientes sur les testicules que je soutins avec un suspensoir; je le mis à l'usage d'une ptisanne apéritive; et il se tint dans le plus parfait état de repos.

Avec ces moyens bien administrés, je me croyois en garde contre les événements fâcheux; j'attendois avec confiance une diminution sensible dans les symptômes qui n'étoient alors que de la douleur. Pendant les trois premiers jours elle diminua au point que le 4^e elle n'étoit plus sensible que sous l'aiguillon du muscle oblique, parcequ'il comprimait le cordon spermatique qui étoit engorgé. L'épididyme et le testicule avoient aussi beaucoup augmenté de volume, et avoient acquis une dureté qui me fit craindre pour la suite. Je fis situer le malade de manière à tenir les muscles du bas ventre dans l'état de relâchement; j'exigeai la diète la plus sévère; je fis

Donner plusieurs lavemens chaque jour, je fis étendre et souvent renouvelles les cataplasmes. La douleur cessa, mais le volume et la dureté firent toujours en augmentant. Je purgeai le malade avec un émétique par lequel il fut bien évacué.

Le huitième jour la dureté étoit au plus haut degré possible. Je plongeai le malade dans les bains doucilliques; Je en pris ouïe. Lorsqu'il sortoit du bain le testicule paroïssoit moins dur et étoit plus pendu sur son cordon. Le malade ne souffroit point. J'appliquois au scrotum un cataplasme auquel j'avois fait mettre moitié de farine résolutive et moitié de pulpes de plantes emollientes. Je le soutenois avec un suspensoir et le malade se remettait au lit. Quinze à seize heures après les choses étoient à leur premier état. Le malade s'affoiblissoit et s'ennuioit de l'opiniâtreté de sa maladie; Je fus obligé de lui permettre une soupe, un tiers et un.

Une piqûre peut causer des accidens, mais je fus surpris de l'opiniâtreté et de la conséquence de ceux ci. Je priai le malade de me confesser s'il n'avoit pas eu autrefois des maladies vénériennes. Il avoua qu'en 1774 il avoit eu un chancre à la verge qui avoit été cicatrisé en peu de tems, que depuis il n'avoit rien ressenti qui put faire soupçonner la présence d'aucun virus, qu'il n'avoit point eu de femmes suspectes, même que depuis deux ans il n'en avoit point eu du tout. C'etoit diverses autres questions que je lui fis il me dit qu'un jour après avoir fait beaucoup d'exercice, il s'étoit évanoui et avoit été longtems dans cet état, que depuis il avoit eu de légères atteintes de spasme et des étourdissemens auxquels il faisoit peu d'attention.

Je m'informai du traitement qu'on lui avoit fait à l'occasion de son chancre. Il me dit qu'il s'avoit qu'on avoit mis de la liqueur dans la plaie. Je ne doutai pas que ce ne fut celle de Wausétiu. Je me suis informé aux aides Chirurgiens du Régiment

qui pourroient en avoir connaissance; jls m'ont assuré qu'il n'en avoit pas fait usage plus de quinze jours.

C'est lui qui de tous les accidents vénériens les chaucres sont celui qui occasionne le plus souvent la vérole. Si la méthode de Haussastin est suffisante pour la guérir on conviendra que ce ne peut pas être en quinze jours. Après y avoir réfléchi, je vis que je croyois le traitement qui avoit été fait insuffisant, que la prompte cicatrisation des chaucres avoit causé l'invasion du virus dans la masse du sang, où il avoit, à la vérité cause peu de ravage jus qu'à cette époque, ce que j'attribuai à la bonne constitution du malade, au plus ou moins d'activité du virus en la personne qui l'avoit communiqué, à la plus ou moins grande résorption qui s'en est faite chez le malade, dont il n'a pas pu infecter les humeurs tout à coup, mais qui, étant parvenu à certain point, n'attendoit qu'une cause déterminante pour se développer; que je considérois comme telle la piqûre que les malades avoit reçue, mon avis étoit de le passer aux grands maux par les frictions suivant la méthode de M. Fabre. J'arrivois au corps, je n'y étois pas venu. Le soupçon de virus après sept années de santé apparente postérieure aux accidents vénériens paroissoit un paradoxe. On consulta un chirurgien d'une réputation méritée. Il examina le malade qui extrêmement jaloux de l'estime de ses chefs craignoit beaucoup de la perdre, au moins en partie, s'il étoit jugé vénérien. Il dit plus ce qu'il croyoit capable de le faire absoudre que ce qui auroit pu faire prendre le parti qui convenoit à son état.

La maladie fut jugée locale. Il fut décidé que nous essayerions les bains et les relâchans, que l'on appliqueroit les cataplasmes de Goutard sur les testicules, et que l'on feroit des frictions mercurielles aux environs, ce qui fut exécuté sur le champ. (Je n'avois osé appliquer les résolutifs, crainte de la terminaison par induration.) Les premiers jours annoncèrent beaucoup de succès. Le soulage de la



tumeur diminua beaucoup. l'œdème du scrotum se dissipa, mais le testicule conserva les deux tiers de son volume. sa dureté fut extrême.

Le malade ne ressentait plus du tout de douleur. Il eût aisément perdu l'espoir d'une prompte guérison. Il fut purgé et reprit peu à peu son régime de vie ordinaire en évitant les aliments qui par leur nature lui auroient été nuisibles. Il se promena, ensuite à vaguer à ses affaires jusqu'à la fin du mois de juillet pendant lequel il fut employé environ une once d'onguent mercuriel à partie égale.

Dans les premiers jours du mois d'août, le malade sentit des démangeaisons à la partie supérieure externe du scrotum à environ deux travers de doigt de la racine de la verge inférieurement, ces démangeaisons devinrent cuisantes, ensuite lancinantes; enfin il se manifesta un point inflammatoire sur lequel j'appliquai des cataplasmes et bientôt la fluctuation fut sensible. J'incisai le scrotum dans toute l'étendue du foyer qui avoit son siège dans le tissu cellulaire. Il en sortit environ deux cuillerées à café de pus grisâtre et assez lié. Je pansai cette plaie en y introduisant une bandelette très fine de linge essé et par dessus à plat un plumaceau le tout chargé de digestif simple. lorsque la suppuration des bords fut établie, je supprimai la bandelette et pansai à plat. le pus ne fut pas toujours égal en qualité: Il fut plus souvent séreux et tirant sur le verd. mes inquiétudes augmentèrent chaque jour. J'en revins à mon premier avis, que l'on ne trouva pas encore juste, on dit que la suppuration faciliteroit le dégorgement du testicule, que la maladie étoit locale, et qu'elle se termineroit en peu de temps.

Le malade sollicité par M. M. ses camarades consulta un Chirurgien en place qui ne balançoit point à l'absoudre. Il lui dit en propres termes qu'il n'avoit point la vérole et qu'on pourroit le guérir en trois semaines. Il fut sur le point de m'ôter sa confiance, et si je n'avois pas été aussi respectueusement attaché à mes devoirs, je l'aurois moi même abandonné aux soins de l'homme dont la sublime intelligence voyoit du premier coup d'œil les moyens de guérir une

maladie qui me paroïssoit très épineuse, et tout à fait différente de ce qu'il la jugeoit.

Je proposai au malade de faire un mémoire dans lequel j'exposerois avec toute l'exactitude dont je serois capable les détails de sa maladie; et que l'on enverroit à Paris. Il accepta; le mémoire fut adressé à M. Fabre qui répondit que le malade avoit la vérole, que ses observations étoient remplies de faits dans ce genre dont les malades ont été guéris en passant aux grands remèdes. Il ajouta dans sa réponse le traitement que le malade devoit subir.

L'autorité de M. Fabre ne fut pas suffisante pour le convaincre et toutes les personnes qui s'y intéressoient. Les avis étoient partagés le malade pencha toujours du côté qui tendoit à l'absoudre, on perdit en discussions inutiles très long et très précieux. L'ulcère pansé avec le plus grand soin suppura toujours et le testicule resta dans l'état de la plus grande dureté.

Du 10 au 15 d'août j'aperçus que vers l'anneau du muscle oblique la peau étoit plus élevée du côté droit que du côté gauche, mais sans changement de couleur; j'y fis d'abord peu d'attention, par la suite le malade y sentit une légère démangeaison. J'y aperçus une fluctuation qui, après avoir été équivoque pendant quelques jours se manifesta à n'en pouvoir douter. La plaie suppuroit toujours et le pus tantôt louable, tantôt fétide fut toujours abondant. Je m'assurai bien que l'humeur contenue dans la tumeur ne communiquoit pas avec l'ancien foyer. J'exposai au malade la nécessité d'opérer son état on assembla une nouvelle consultation composée d'un médecin et deux chirurgiens. Je fis le détail de la maladie et du traitement. Je lus la consultation de M. Fabre, on examina le malade; on jugea la maladie simple et on rejeta fort loin l'idée des remèdes. on décida que la nouvelle tumeur quoique peu caractérisée seroit ouverte, de tel genre qu'elle fut. elle avoit une forme allongée dont la pointe étoit vers l'anneau et la base à la partie moyenne inférieure du



Scrotum. J'en fis l'ouverture le 6.^e en présence d'un des consultants. Par une incision, je coupai la peau et les muscles jusques à la tunique vaginale depuis l'anneau jusqu'à la partie tout à fait inférieure de la tumeur. ensuite j'incisai la tunique vaginale en commençant par la partie supérieure. à peine mon instrument y eut pénétré que la sérosité qu'elle contenoit me sauta au visage. nous trouvâmes le cordon et le testicule flottans en une seule poche, en conduisant la pointe de mon instrument avec le doigt indicateur d'une main, j'incisai le sac jusqu'à la partie tout à fait inférieure. Il se répandit environ trois cuillerées de sérosité un peu rouge, mais très claire.

Je pansai la plaie avec du charpie sec, des compresses imbibées d'eau tiède et d'eau de vie soutenues par un suspensoir. le lendemain matin j'otai les compresses ensanglantées, j'enlevai la portion de charpie qui me tenoit pas; je recouvris la plaie avec des compresses imbibées de la même liqueur que la veille. Je n'entrerai point dans les détails du régime à cause de la longueur où cela m'entraîneroit. Ce ne fut qu'en plusieurs jours et à l'aide de la suppuration que je parvins à lever le charpie. Je pansai avec un digestif simple.

Le cinquième et sixième jours l'ancien et le nouvel ulcère suppurèrent beaucoup, ce qui fut espérer le dégorgeement du testicule. Le malade fut purgé avec un gros de pillules de Belloste. le lendemain il fut mis à l'usage d'une pillule du poids de 15 grains, la suppuration se soutint toujours de manière à ne pas faire craindre de continuer.

Lorsque je fis cette opération, je n'ignorois pas ce que les auteurs ont écrit sur la cure de l'hydrocele par excision; le sac de celle-ci ouvert et étendu au dessous du cordon sur le tissu cellulaire dont il est naturellement recouvert présentoit une surface d'environ 3^{es} de pouce à la partie supérieure et s'élargissoit inférieurement jusqu'au testicule où il avoit environ 3^{es} de pouce, ce qui ne me parut pas assez considérable pour en retrancher.

Mon premier appareil ne consista donc qu'en charpie de linge

fin. Je ne m'attendois pas à la forte adhérence qu'il contracta sur la tunique albuginée et sur le corps du testicule. C'est qui l'aide de la suppuration que je pus en enlever un peu chaque jour et je trouvois toujours dessous, sur la tunique albuginée, qui étoit auparavant très lisse et très blanche de petites taches très vermeilles qui s'élevaient de distance en distance, elles augmentèrent très promptement, et joignirent ensemble et formèrent une couche charnue très délicate.

Le septième jour j'enlevai sans efforts le dernier brin de charpie de dessus le corps du testicule. Ce même jour il y avoit un commencement de cicatrice à la partie supérieure de la plaie. Les chairs s'élevaient au dessus des bords, je les saupoudrai avec la Colophane en poudre, elles s'affermirent et la cicatrice fit des progrès si rapides qu'elle fut bientôt affermie partout. En trois semaines (depuis l'opération), elle étoit adhérente dans toute sa longueur au cordon et au corps du testicule qui conserva son volume et surtout sa dureté.

Pendant la cure de cette grande plaie, je fus surpris que la tere suppurât avec tant d'abondance. Le pus étoit toujours verdâtre, un peu d'une odeur assez forte. Il mit en fonte le tissu cellulaire des environs et forma un cratère assez profond vers la partie inférieure.

Qu'au commencement d'octobre, il se forma un point inflammatoire à côté du raphé à la partie tout à fait inférieure du scrotum. J'y appliquai des cataplasmes, la fluctuation y fut sensible le 8^e ou le 10^e jour. Je m'aperçus aussitôt de la communication des deux foyers par le pus sanguinolent qui sortit par la plaie en appuyant sur la tumeur. au moyen d'une sonde cannelée, j'incisai le scrotum de manière à découvrir tous les clapiers et ne faire qu'une seule plaie dont je pouvois voir et panser tout le fond. cela me parut bien suffisant pour le local mais je tenais toujours à ma première opinion et je voulois attaquer la cause qui me paroissoit entretenir les accidents actuels et qui selon moi devoit en occasionner de plus graves dans la suite. On consulta encore et mon avis fut rejeté de nouveau. on crut que les dernières



incisions mectroient fin à la maladie dont on attribua la longueur aussi
que les mauvaises qualités du pus au long séjour qu'il faisoit dans
les sinus. On cessa l'usage des pillules de Belloste lorsqu'on crut le
malade suffisamment évacué, et qu'on vit que comme fondant, elles
n'opéroient aucun changement sur les testicules. Les aurais-ou
continues comme antivenériennes? elles n'étoient pas suffisantes. on
ne pouvoit se refuser un point de vue certain. Si le malade n'étoit
pas affecté par le virus, il falloit bannir les antivenériens. S'il l'étoit
il falloit employer des remèdes dont l'efficacité pût nous promettre
un heureux succès.

Le Régiment étoit à la veille de changer de garnison, ce n'étoit pas
l'instinct d'insister plus fortement. Je m'appliquai avec le plus grand soin
au traitement simple. Le Régiment partit le 24. 8^{bre}. Il eut 13 jours
de route que le malade fit en voiture. Il seroit trop long de rapporter
le journal de cette route. La suppuration varia en quantité et en
qualité. en arrivant à la garnison, les bords étoient gonflés et durs.
j'appliquai l'emplâtre d'onguent de la mère. un régime plus suivi
et le repos rétablirent la suppuration, les bords s'affaiblirent, le
testicule resta toujours dans son état de dureté.

Vers le 10. 9^{bre} le pus me paroissoit en plus grande quantité que le
fond de la playe ne sembloit devoir en produire. en palpant le
testicule sur tous les sens, je découvris l'orifice très étroit d'un
sinus qui paroissoit pénétrer dans la substance du testicule.
Le malade dont la sensibilité a causé la perte ne voulut pas
permettre d'en reconnoître le trajet par la sonde. Si cette
suppuration avoit sa source dans le corps du testicule, elle
n'avoit pas été annoncée par les signes ordinaires. le malade n'y
avoit point ressenti de chaleur ni de douleur.

Pendant tout le mois de Novembre, il eut de fréquents accès

de douleurs très vives sous le muscle facialata, et toute la partie
extérieure et supérieure de son aponeurose, toujours la nuit et
jamais le jour.

Enfin après avoir employé tous les moyens possibles et dont le
détail seroit excessivement long, le malade demanda encore une
nouvelle consultation. C'étoit à Lille en Flandre, on appella
M^r. De Milville dont les talens reconnus inspirer la plus
grande confiance, M^r. Chasteneu célèbre praticien dont l'Académie
a souvent loué les ouvrages et trois Chirurgiens Majors de
différens corps.

La Consultation fut rédigée: « Tous E^x. Certifions qu'après
lecture du mémoire ci contre et examen très scrupuleux de la
maladie qui en fait le sujet... Déclarons que son opiniâtreté
et tous ses symptômes ne peuvent se rapporter qu'à un vice
général. Et ce 13^{ème} 2^{ème} 18^{ème} 18^{ème} M^r. Chasteneu, De Milville, Dieffen-
Clavreau et Couraud.

Le malade décidé par le résultat de cette consultation se disposa à
passer aux grands remèdes. La difficulté de rassembler chez lui toutes
les commodités nécessaires et la réputation méritée de M^r. Chasteneu
l'engagèrent à se mettre à l'hôpital. Le détail du traitement n'entraîneroit
au delà des bornes que je suis obligé d'en prescrire; la sagesse
de l'habile praticien qui le dirigea doit nous convaincre de sa
perfection; ainsi je passe à la progression de l'ulcère pendant
l'administration des remèdes.

Que l'on se rappelle la formation du premier abcès, l'ouverture
qui en fut faite, les pansements qui y furent administrés, l'étendue
du foyer vers la partie inférieure, la dilatation qui en fut faite
jusqu'à la partie la plus déclive, et un peu au delà, enfin
l'orifice du sinus qui fut appercu à la partie moyenne, mais dont on
ne connut pas la profondeur ni la direction, la quantité et la



qualité du pus qu'il fournissait, on aura une idée nette de la maladie et de l'état de l'ulcère à l'époque du premier bain.

Le malade eut pris un matin et soir, à-peine eut-il fait usage pendant quelques jours, qu'il sentit moins d'anxiété aux parties malades et même aux environs. Le testicule, parut plus pendant et plus mollet, effet indubitable des remèdes relaxans.

Le 23 et 29 Décembre pendant la nuit il eut un accès de douleurs sciatiques très violentes. En suivant la période ordinaire, un autre accès devoit se faire sentir du cinq au six Janvier. Mais le malade étoit entre la 3^e et la 4^e friction. Il eut l'agréable surprise de ne point sentir la douleur cruelle à laquelle il s'attendoit. On attribua cette disparition à l'effet du remède. La suppuration augmenta, sa qualité devint plus louable. Le fond du sinus parut se porter transversalement de droit à gauche et de bas en haut. Vers les dernières frictions, on ne douta plus que la douleur sciatique qui avoit marqué plusieurs de ses périodes, n'eût disparu pour toujours.

Le traitement antivenérien fini, on fut bien persuadé de la destruction du virus. M. Chasteneu attaqua le local, muni par des moyens auxquels je n'aurois pas consenti, si le malade avoit été ailleurs qu'à l'hôpital. mon avis étoit d'ouvrir tous les sinus, de découvrir le testicule et de l'extirper. S'il étoit dans un état à n'en pouvoir espérer la guérison. mais la pusillanimité du malade engagea M. Chasteneu à prendre des moyens qui étoient moins désagréables au malade que parureux plus dangereux.

On appliqua dans le vuie de supprimer la suppuration et d'obtenir une cicatrice des cataplasmes avec la farine de fève et le vinaigre. Ce répercussif eut tant d'activité que le malade ne put le supporter. on le remplaça par un spargadrap de diachylon gommé et de ciguë dont on couvrit tout le scrotum. on le maintint avec un suspensoir et on ne leva cet appareil que de trois jours en

passoit dans le tissu cellulaire) les loupes ou dessus de l'ectocrate) supérieure au testicule et qui étoit interrompue par un épithélium
l'on ne s'ignore pas que dans la lésion des glandes conglobées et de
de leurs canaux par une cause quelconque, la suppuration participe
au caractère de l'humeur qui s'est filtrée particulièrement dans
testicules. Dans la maladie dont nous traitons, nous ne voyons la cloison
n'a point indiqué la lésion du testicule par sa direction, mais le pus
à l'organe de l'homme est tel qu'il se trouve dans les vésicules
qui ont leur siège dans les canaux et dans le tissu cellulaire
Si on ne croit qu'on a vu toujours les vésicules dans le tissu
ou l'ectocrate et l'organisation entièrement détruite, que cette unique
information étoit plus propre à la sécrétion de l'humeur qui se
démêlait avec le pus nous aurions instruit de son véritable état,
que pour ces raisons il pouvoit être ulcéré sans que nous apper-
çussions les stigmes qui l'annoncent ordinairement. Je dis que dans
un cas comme dans l'autre, l'incision étoit la même; qu'en
vaporant une sonde dans les canaux on avoit fait le filon, il falloir
inciser d'une incision à l'autre, qu'en mettant ainsi le filon
à découper, on le passeroit méthodiquement; que si le corps du
testicule étoit intact le malade guériroit en peu de temps, c'est à dire
qu'on obtiendrait une cicatrice, que les vésicules de l'ectocrate se
perforeraient, mais que le corps du testicule resteroit stérile.

Cela me représentera bien la cruauté de toutes ces incisions et
l'inutilité de celles qui n'ont été faites avant. Il est plus tard
de l'écoulement d'un malade par une longue et abondante
suppuration qui en l'entraînant dans le marasme le plonge au
tombeau. Si une prompte opération ne l'y précipite pas avant
d'avoir atteint le dernier degré de cette fâcheuse maladie; pour
à l'instant les premières incisions se font à l'instant où le
filon le malade avoit la stérilité.

Le malade parut effrayé d'une proposition qui n'étoit pas aussi étendue que le détail que je viens d'en faire. Je lui représentai que si on ne faisoit ce que je proposois, non seulement ces ulcères ne guériraient point, mais que le pus y séjournerant acquerreroit des qualités nuisibles, qu'il mettroit en fonte le tissu cellulaire et formeroit des clapiers dont je ne pouvois deviner la direction, que je présumois qu'elle seroit vers la partie inférieure, que si par cette négligence le testicule, que je croyois encore sain, tomboit en suppuration, la maladie ne seroit curable, que par l'extirpation, que cette opération praticable à présent (à la fin de février) ne le seroit plus dans un temps plus reculé sans exposer évidemment sa vie à cause des accidents qui pourroient survenir au cordon; qu'étant aussi désagréable que dangereuse dans tous les temps, il falloit employer toutes les ressources de l'art pour l'éviter, que je n'en voyois point de plus certaines que celles que je proposois. Enfin il se référa à l'avis de M. Chasteneau qui étoit absent, et ma surprise fut extrême de lui entendre dire qu'il falloit attendre, qu'il le guérirait par l'application de l'alcali volatil-fluor.

Mes représentations furent inutiles. Le malade eut l'injustice de me croire guidé par l'envie d'opérer. On étendit une cuillerée à bouche d'alcali volatil-fluor dans une bouteille, d'eau commune, on en imbibait des compresses, on les plaça sur tout le scrotum, elles furent maintenues par un suspensoir. &c.

Par la 2^e bouteille, on mit deux cuillerées d'alcali, on en injecta dans le sinus par les orifices; on le faisoit passer par un, il reportoit en jet par l'autre avec presque autant de rapidité qu'il sortoit de la seringue, preuve évidente que dans cet état le foyer avoit peu d'espace, et qu'il étoit droit d'une ouverture à l'autre.

La suppuration augmenta considérablement, et on dit que le testicule fondoit; moi je dis qu'il n'en étoit rien, mais que le volume total



diminuoit par la fonte des parties environnantes.

A la fin de Mars, ce que j'avois prévu étoit arrivé. Le pus séjourna entre les deux orifices mis en fonte le tissu cellulaire qui l'environnoit, et son propre poids l'entraîna plus vers la partie inférieure, il s'y forma une poche qui quand on en avoit exprimé la matière qu'elle contenoit pouvoit recevoir une pleine seringue d'injection. Le pus augmentoit chaque jour et on l'attribuoit encore à la fonte du testicule (qui pourtant étoit toujours aux yeux de ceux qui ne vouloient pas s'aveugler par une illusion qui n'avoit aucun fondement, dans le même état). Qui est ce qui ne sait pas que le pus augmente toujours à proportion de l'étendue de la surface qui le produit, et du voisinage des parties qu'il met plus aisément en fonte? n'est il pas naturel qu'une petite quantité de pus qui n'a point d'issue en produise une plus grande quantité? n'est ce pas une axiome en chirurgie que le pus fait le pus.

Enfin vers le 28 on se contenta d'enlever les compresses imprégnées du pus qui sortoit par regorgement, on supprima les injections et on exprima plus le foyer. L'ouverture s'accrut un peu. Les bords se recouvrirent, ils devinrent calleux et d'un rouge pâle. néanmoins il mangea à discrétion, on lui ordonna des promenades qu'il mesura peu puisqu'il lui arriva de faire plusieurs lieues en un jour ou l'assura que cela alloit bien.

Dans les 1^{ers} jours d'avril il eut chaque soir un petit accès de fièvre que j'attribuai à la resorption d'une partie du pus, laquelle est inévitable quand on le laisse séjourner dans des sinus d'une certaine étendue. toutes les glandes inguinales du côté droit se engorgèrent extérieurement. le malade repentit de nouveau les douleurs sciatiques. elles s'étendirent aux lombes, le long de la cuisse et de la jambe, il ne pouvoit fléchir le corps qu'avec beaucoup de peine.

Enfin le 16 avril on cessa l'usage de l'alkali volatil. On eut recours à une dissolution d'alun et de vitriol assez forte que l'on appliqua de la même manière. La suppuration ne fut heureusement pas supprimée. Il en résulta le 17, 18, et 19 un léger mal de gorge. Il se forma une 3^e ouverture à un travers de doigt du raphe du côté gauche, tout à fait inférieurement. Tout cela ne rebuta point le malade. Il soutint toujours son système. On changea la dissolution aluminieuse en un cataplasme astringent. Il fut purgé une fois et la douleur sciatique devint d'une violence que le malade ne pouvoit plus supporter.

La sagesse nature le protégea. tous les moyens que l'on employa ne purent tarir la suppuration, ce qui en fut abandonné le projet. On revint à l'alkali. la suppuration est rétablie au point où elle étoit auparavant et les douleurs diminuerent. quelques jours après l'ouverture du côté gauche se referma. Celle du milieu resta au même état, et celle du côté droit varia comme font ordinairement les ulcères fistuleux, qui ont plusieurs issues. quelque le pus trouve plus de pente vers l'une, l'autre semble se cicatriser; mais les gens de l'art ne crient point victoire pour cela; pas un ne sera surpris de voir huit jours après une autre ouverture, du même en faire autant, et celle-ci suppure comme auparavant.

Le malade tomboit dans la mélancolie, la maigreur sembloit l'amener à la fièvre lente et au marasme. Ces raisons sans doute et le peu de succès de l'alkali volatil firent supprimer encore une fois. on y suppléa par une dissolution de sel marin dans l'urine du malade appliqué comme on avoit fait l'alkali. Il s'envenimoit, on le consola en lui faisant entendre qu'il falloit continuer ce remède et que s'il n'avoit pas le succès qu'on en devoit attendre, on prendroit un parti, mais que l'on en avoit vu des miracles. On promit de le guérir sans le secours du fer.

J'arrivai un jour chez le malade à l'instant où il s'occupoit



à remettre son bandage qu'il aura été plus l'arrangement plus convenable
cela me procura l'occasion d'examiner les parties. Je trouvai l'érosion
autour de l'orifice du scrotum de la grandeur d'une pièce de 24 sols,
d'un rouge pâle et lisse, rempli de petites éminences excelleuses.
Je palpai le testicule sur tous les sens, son volume ne parut
toujours le même. Sa dureté me parut égale à ses faces postérieure
supérieure, inférieure et latérales, mais cette dureté avoit quelque chose
d'élastique que je crois n'avoir pas remarqué avant. A sa face
antérieure et un peu inférieure cette élasticité étoit bien plus marquée
et je ne pus douter qu'il n'y eût un foyer assez considérable, quoiqu'en
y appuyant le pied ne regorgeât par aucune de ses issues. Je persistai
dans mon premier sentiment, et je dis au malade que je jugeois
tous les remèdes qui avoient été administrés depuis la fin des
grands remèdes jusqu'à cet instant, tout au moins inutiles, qu'il
me paroissoit évident que les opérations chirurgicales auroient
un succès moins certain que lors de mon premier avis du 3 mars;
néanmoins que je persistois à dire qu'il falloit nécessairement y
avoir recours, par une ou plusieurs incisions ouvrir le foyer et
dilater tous les clapiers (sauf les restrictions que nous avons
faites plus haut) mettre à nu le testicule et son cordon, en
faire l'extirpation aussitôt de la manière qui paroitroit la
plus convenable à l'état des parties.

Enfin le 28 du même mois, M... se rendit à l'évidence (mais trop
tard) il me fit dire de me trouver à son appartement. après avoir
introduit une sonde cannelée avec assez de difficulté par l'orifice
supérieur, il reconnut deux trajets, un qui se portoit de
dedans en dehors et inférieurement communiquoit avec l'ancienne
ouverture du sinus, un autre qui tomboit perpendiculairement
vers la partie inférieure et alloit se terminer dans l'espace où
j'ai dû avoir déterminé le foyer. Ce fut celui-ci qu'il incisa